

Über den Zahnkieferbefund bei Hilfsschülern

Inaugural Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Medizinischen Fakultät der Friedrich Alexander Universität
Erlangen

vorgelegt von

Lorenz Raum,

approbierten Zahnarzt in Fürth i. Bay.

der mündlichen Prüfung: 22. 10. 1935



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Über den Zahn-Kieferbefund bei Hilfsschülern :

Zahnheilkunde steht heute an einem wichtigen Zeitabschnitt ihrer Entwicklung. Die Betätigung des Zahnarztes in früherer Zeit erstreckte sich im wesentlichen auf die Behandlung des Zahnes als Einzelgebilde, das gewissermaßen beziehungslos zum Gesamtorganismus betrachtet wurde. Der Begriff

Organon dentale mag dieser Anschauung entsprechen. Bald aber lernte man, daß es unzweckmäßig ist, den Zahn einer derartig isolierenden Anschauung zu unterwerfen und fasste das Arbeitsgebiet des Zahnarztes weiter, indem man vom Zahnkiefersystem sprach. Durch die Aufstellung dieses Begriffes wurde der Zahnheilkunde ein großer Fortschritt vermittelt, denn in der Synthese, die diesem Begriffe innewohnt, lag die Basis, die Zahnheilkunde auf ihrer technisch-mechanischen Denkart auf allgemeinere medizinische Grundlagen hinzuführen. So entstand allmählich der Begriff des Zahnarztes, der ungefähr identisch mit dem eines Facharztes war. Die Zahnheilkunde nahm nun, als eine Tochter der großen Allgemeinmedizin, allen wesentlichen Erscheinungen, Krisen und Aufschwüngen derselben teil. So ist es auch in unseren Tagen. Die Aufteilung der Medizin in eine Reihe von Fachgebieten hat aber neben vielen Vorzügen den großen Nachteil mit sich gebracht, daß in vielen Fällen der Zusammenhang verloren ging. Heute wird auf allen Gebieten der Medizin dieser Zusammenhang zwischen einzelnen Teilen des menschlichen Körpers bewußt betont und so steht auch das Zahn-Kiefersystem nicht mehr als ein isolierter Begriff da, sondern gewinnt mehr und mehr noch im Zusammenhang mit der Allgemein-Medizin sowie mit dem gesamten Körper betrachtet und behandelt zu werden. Es ist vor allem die Forschung über die Parodontose, die fokale Infektion und chirurgischen Erkrankungen des Zahn-Kiefersystems, die uns zum Teil auf hinwiesen, zum Teil direkt zwangen, nicht mehr das Zahn-Kiefer-System allein, sondern den ganzen Körper zu behandeln.

Besondere ist es die innere Medizin, die ja doch die Gesamtgrundlagen der ärztlichen Ausbildung und Tätigkeit ausmacht, mit der die Zahnheilkunde immer engere Fäden flicht. Dabei ist dieser Konnex kein einseitiger. Obwohl der Internist lenkt heute in erhöhtem Maße sein Auge auf das Gebiet der Zahnheilkunde, als auch umgekehrt der Zahnarzt auf die interne Medizin. Wenn man ein Lehrbuch der inneren Medizin zur Hand nimmt und die einzelnen Krankheiten auf ihre Ätiologie hin untersucht, so wird man in der Mehrzahl der Fälle, zunächst sind hier alle infektiösen Prozesse gemeint, die Wörtchen kryptogen finden, d. h. die Eintrittspforte der Erreger ist zunächst unbekannt. Wer aber als gewissenhafter Zahnarzt nicht nur die Kronen der Zähne einer genauen Betrachtung unterwirft, sondern auch einen tieferen Blick in das Innere des Kiefers tut, wie ihn die Röntgenahlen uns leicht vermitteln, der wird entsetzt sein über die ungeheure Zahl apikaler Herde. Es ist freilich ungeheuer schwer zu beweisen, daß der Zusammenhang zwischen diesen Herden und Allgemein-Krankheiten

besteht, aber genau so schwer ist es zu beweisen, daß dieser Zusammenhang nicht besteht und nach dem Gesetze der Wahrscheinlichkeit müßte wir, und insbesondere der Internist, diesen Zusammenhang eher annehmen als ablehnen. Seitdem man gelernt hat die Aufmerksamkeit auf fast symptomlose, lange Zeit bestehende chronische Infektionsherde zu lenken, haben wohl viele Fälle von kryptogener Sepsis Aufklärung gefunden. Es ist bestimmt nicht richtig Granulome als symptomlose Infektionsherde zu bezeichnen, vielleicht können manchmal eingeeheilte Granatsplitter als solche angesehen werden. Es ist weiter fraglich, ob von solchen Herden aus, die eigenlich schon die Bezeichnung Herd nicht mehr verdienen, Allgemeinkrankheiten ihren Ausgang nehmen können. Manche Fälle von spätauftretendem Tetanus sprechen vielleicht sogar dafür. Mir scheint es aber immer mehr, daß eine chronische Herde, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für ihre ätiologische Bedeutung in einem Krankheitsfalle besteht, subakuten Charakter hat. Eine Eigentümlichkeit dieser Herde besteht darin, daß sie einen fluktuierenden Charakter aufweisen und zu subakuten und akuten Exacerbationen neigen. Man kann häufig beobachten, daß Recidive einer Krankheit oder Auftreten neuer Krankheitserscheinungen mit solchen Exacerbationen zeitlich zusammenfallen.

Nicht nur auf dem Gebiete der Fokal-Infektion wurde dieser Zusammenhang mit der inneren Medizin evident. Auch die Parodontoseforschung machte immer deutlicher. Namentlich als die Histologie und besonders die Parodontoseforschung auf Grund ihrer Ergebnisse dem Zahn und seinem System eine biologische Rolle zuschreiben mußten und absolut einwandfrei festgestellt wurde, daß zwischen dem Zahn und dem Gesamtorganismus lebhaftest Wechselwirkungen bestanden. Als Beispiel mögen uns hier namentlich jüngere Arbeiten von Küchler dienen, der die Beziehungen der Parodontose zu vegetativen Störungen sehr klar herausgestellt hat, und der die Parodontose als Ausdruckserscheinung eines vegetativ erkrankten Organismus bezeichnet. Danach ist die Parodontose zu einem Problem der Diätetik. Jedoch muß immer wieder betont werden, daß auch ferner hin nur durch gleichzeitige lokale und allgemeine Maßnahmen eine Gewähr für eine erfolgreiche Behandlung gegeben ist. Das Zahnfleisch gehört zu den feinsten Indikatoren sowohl bei Allgemeinerkrankungen als auch bei lokalen Störungen in der Mundhöhle, es darf nie vergessen werden, daß zwischen Zahnfleisch und den einzelnen Teilen des Organismus eine vielseitig ausgedehnte Wechselwirkung besteht, die bei jeder Parodontosebehandlung als oberstes Prinzip zu gelten hat. Man hat sich vielfach angewöhnt bei Krankheiten nach einer Ursache zu forschen, ohne dabei zu bedenken, daß es überhaupt keinen Vorgang gibt, der durch eine Ursache allein bewirkt wird, sondern daß es immer eine Vielheit von Bedingungen ist, die denselben auslöst. Nicht umsonst wird daher Verworn das kausale Denken in der Medizin durch das kombinatorische ersetzt wissen. Aber gerade in der Vielheit der Bedingungen besteht die Schwierigkeit der Behandlung einer Krankheit. Zumal dann, wenn die einzelnen Faktoren, die ein pathologisches Geschehen auslösen, noch nicht einmal hinreichend bekannt sind. Es ist die Aufgabe der vorliegenden Arbeit, dazu beizutragen, all den Bedingungen die irgendwie Veränderungen im Zahn-Kiefersystem nach sich ziehen, nachzugehen.

Die folgende Untersuchung erstreckt sich auf sogenannte Hilfsschüler, sind Kinder, die irgendwie körperlich oder geistig so zurückgeblieben

sie dem normalen Schulunterricht nicht folgen können, und daher in ne sogenannte Hilfsklassen zusammengefaßt wurden. Das Material setzt aus den verschiedensten Krankheitsgruppen zusammen. Teils handelt sich um frühzeitig mitgemachte Infektionen, teils um wirkliche Geistes-
krankheiten im Sinne der Schizophrenie und des manisch depressiven Irre-
s. Weiterhin handelt es sich bei diesen Kindern um Störungen inner-
retorischer Organe wie z. B. des Kalkstoffwechsels, Störungen der
ilddrüse usw. auf die im folgenden näher eingegangen werden soll.

ersuchungen dieser Art sind nicht neu. In der Literatur finden sich
wenige eingehende Beobachtungen. Es war im wesentlichen Greve,
über solche Untersuchungen berichtet. Er hat seine Untersuchungen
Magdeburger Schulkindern vorgenommen und kommt zu folgendem
ebnis:

Hauptkrankheit der Zähne, die Caries ist scheinbar bei den Kindern
Hilfsschulen etwas geringer, denn 5,95 % hatten intakte Gebisse, gegen-
r 3,07 % der übrigen Kinder, indessen mag das Zufall sein, da hier
22, dort nur 84 Kinder untersucht wurden. Sehr hoch ist dagegen der
zentsatz an Hypoplasie der Zähne, nämlich 30,95 % bei den Kindern
Hilfsschulen gegen 20,40 % bei den anderen Kindern. Von den 30,95 %
poplasie waren 21,43 % an der Mutterbrust gestillt, 9,52 % waren nicht
tillt. (Von den anderen Kindern betragen die Zahlen 13,47 : 6,94 %)
sonders erwähnt sei, daß von den 20,41 % derselben Kinder bei 2,03 %
poplasie der Milchzähne gefunden wurde. Unter den gefundenen Ano-
trahierten und hochgezogenen Gaumengewölbe, wie sie bei Idioten
l Irren häufig gefunden werden, ein besonderes Interesse. Es wurden
8 % gegen 0,17 % bei den übrigen Kindern festgestellt. Bei 20,24 % der
oder fand ich Strabismus, bei 3,57 % starke Myopie und bei ebenfalls
7 % Hornhauterkrankungen.

ebhard berichtet, daß die Zähne schwachsinniger Kinder häufiger Spuren
Rachitis und sonstige Degenerationserscheinungen aufweisen, als die
ähne gesunder und normaler Kinder.

henk hat die Beziehungen der chronischen Nervenkrankheiten zur
hnikaries untersucht. Er hat an einem größeren Material des Wiener
inzer Spitals das Verhalten der Zähne zu multipler Sklerose und anderen
ronischen Nervenkrankheiten studiert. Es wurden untersucht Patienten
Tabes-Taborporalyse, Arterio-sklerose, Parkinsonismus und Paralysis
tans. Aus seinen Untersuchungen zieht Verfasser den Schluß, daß bei
ronischen Nervenkrankheiten die Zähne eine sehr beträchtliche Schädigung
fahren dürften, wobei ein Überwiegen im Zugrundegehen der Backen-
ähne gegenüber den Frontzähnen zu beobachten war. Aus den tabellarischen
ufzeichnungen ergibt sich, daß man bei Nervenkranken gewöhnlich mit
ehr als zwei Drittel kranker Zähne rechnen kann im Gegensatz zu einem
ittel bei nicht Nervenkranken.

rigalski schreibt in seinem Werk über Schulgesundheitspflege: „Wir
wissen finden, daß Schüler mit schlechter Körperbeschaffenheit, die als
berkuloose gefährdet befundenen und die Dauerausscheider bei Diphtherie,
e den Nachweis stärkeren Haftens der Krankheitskeime ja besonders
cht und exact gestatten, vorwiegend solche mit schlechten Zähnen und

beeinträchtigt Kaufähigkeit sind. In Einzelfällen scheint uns die Vernachlässigung der Zähne eine den Gesamtstoffwechsel schädigende Wirkung zu zeitigen."

Über Degenerationserscheinungen in der Mundhöhle schwachsinniger richtet Remstädt:

Die Mundhöhle ist häufiger Sitz von Degenerationszeichen, die wohl besten und längsten im Munde von Kretinen beobachtet worden. Als eines der am häufigsten in der Mundhöhle Schwachsinniger anzutreffenden Degenerationszeichen wird der deformierte, insbesondere der harte Gaumen genannt. Auch die Kieferdeformationen Prognathie und Prognathismus werden unter gewissen Bedingungen als Degenerationszeichen betrachtet. Die bekannten Anomalien der Zähne in bezug auf Durchbruch, Zahl, Stellung, Größe und Form sowie Struktur finden sich fast sämtlich bei Kretinismus recht häufig. An Hand der einschlägigen Literatur werden die einzelnen Degenerationszeichen beschrieben. Eine Gesetzmäßigkeit, daß die genannten Anomalien auf geistige Minderentwicklung schließen lassen, besteht keineswegs, immerhin dürften aber eine ganze Reihe verschiedener Momente als prädisponierend für die mangelhafte Entwicklung von Kiefer und Zähnen in Betracht kommen. Verfasser nennt als solche Rachitis, hereditäre Toxikose, Alkoholismus der Eltern, kongenitale Lues, Blutsverwandschaft der Eltern und schließlich die innere Sekretion.

Im wesentlichen sind mir weitere Erörterungen in der Literatur nicht bekannt geworden. Obwohl wie schon einleitend gesagt, gerade die Untersuchungen von Hilfsschülern vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus von besonderem Interesse ist. In der vorliegenden Untersuchung sind 372 Schüler der Nürnberger Hilfsschulen erfaßt. Es ist nicht anders als mit Hilfe der Statistik möglich, die Forschungsergebnisse zu veranschaulichen. Ich bin dabei bewußt, daß bei allen Statistiken die Gefahr nahe liegt, vieles hineinzulegen und aus ihnen herauszulesen, was in Wirklichkeit gar nicht drinsteht. Namentlich ist dies bei Statistiken der Fall, die über eine zu geringe Anzahl Material verfügen. Nachdem aber in der Literatur nur eine einzige Statistik von 86 Kindern durch Greve bekannt geworden ist, glaube ich doch berechtigt zu sein, das Material hier statistisch zu verwerten. Es ist doch heute so, daß mehr denn je die sozialen Fragen in den Vordergrund treten und hier bietet die Statistik eine willkommene Handhabe, entweder unter sorgfältiger Abwägung und Vergleichung auf bestehende Übel und Gefahren hinzuweisen, oder für die Wissenschaft das sicherste Material darzustellen, alles, was sonst nur vereinzelt Vorkommen oder verworrenen Mutmaßung blieb, einzuordnen und durch quantitative Bestimmung und Vergleichung zu sicheren Tatsachen und verlässiger Einsicht zu führen. Die Statistik verleiht Massenerscheinungen die ihnen gebührende Geltung, während zufällige Einzelheiten sich in ihr als tatsächliche Ausnahmen herausweisen, die keine Verallgemeinerung zulassen. Kein geringerer als Sozial-Hygieniker Fischer schreibt über den Wert der statistischen Forschung: Seitdem man die Beziehungen zwischen Krankheiten und sozialen Zuständen intensiver und systematischer als in früheren Zeiten studiert hat, hat man mehr als je zuvor die hohe Bedeutung der medizinischen Statistik erkannt.

im folgenden angeführte Statistik stellt eine Zusammenfassung des Fundes des Zahn-Kiefersystems bei Hilfsschülern dar. Sie selbst ist nur eine Zusammenfassung von vielen Einzelerhebungen, die aber wegen all-großen Umfangs und auch untergeordneter Bedeutung hier nicht mitgeführt sind. Dadurch wird ein besserer Überblick vermittelt und die Gefahr verhindert, sich in nebensächlichen Details zu verlieren. Die erste Rubrik behandelt Störungen des Zahndurchbruches. Hier sind nur die Fälle gezeichnet, die entweder einen wesentlich verfrühten, oder wesentlich verspäteten Zahndurchbruch im bleibenden oder im Milchgebiß aufwiesen. Die Anomalien der Zähne habe ich besonderen Wert auf die Untersuchung der Schmelzstruktur und der Stellung der Zähne gelegt. Die Veränderungen der Schmelzstrukturen schienen mir deshalb von Bedeutung, weil an ihnen Störungen der inneren Sekretion und auch des Stoffwechsels besonders deutlich zu studieren sind. Bei der nachfolgenden Rubrik, die Bißanomalien umfaßt, wurden nur wesentliche Mißbildungen ins Auge gefaßt. Eine genaue Einteilung, etwa nach der Methode von Angle oder Greve wurde nicht durchgeführt, sondern nur Diagnosen wie Progenie, Prognathie, Scheren-biß, offener Biss usw. aufgeführt. Bei der Rubrik kariöse Zähne liefert die Summe der beiden Zahlen, die im Gebiß vorhandene Gesamtzahl der Zähne. Die erste Zahl gibt die gesunden, die zweite die an Karies erkrankten Zähne an. Bei Mißbildungen galt es vor allem auf grobe anatomische Veränderungen des Mundes und Kiefers zu untersuchen. In der letzten Rubrik sind mitgemachte Krankheiten und sonstige anamnestische Daten, soweit sie in Erfahrung gebracht werden konnten und für die Beurteilung des Einzelfalles von Wichtigkeit waren, angeführt.

Ich bin mir bewußt, daß trotzdem die Statistik lückenhaft ist. Es ist schwer überhaupt in Erfahrung zu bringen, aus welchen Gründen derartige Kinder, die doch eigentlich nur wegen äußerer Symptome in Hilfsschulen gebracht werden, sei es nun, daß sie körperlich oder geistig behindert sind, überhaupt vom medizinischen Standpunkt aus zu derart bedauerlichen Geschöpfen werden. Die entsprechenden Schulbogen enthalten nur mangelhafte, zum größten Teil überhaupt keine klinischen Diagnosen. Eine eingehende Untersuchung ist technisch nicht durchführbar.

T A B E L L E.

Fall Nr.	Stö- rungen des Durch- bruchs der Zähne	Ano- malien der Zähne	Biß- Ano- malien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungs- zeit	Kariöse Zähne	Mißbil- dungen	Mitgemachte Erkrankungen
1 w	1. J.				21 zu 4	h. Gaum.	Masern, Keuchhu-
2 m		6 r. o. 6 Höcker			19 zu 3		Rachitis
3 w					24 zu 0		Hufschlag a. d. Sc
4 m				r. u. l. o. Hyp.		hoher Gaumen	Konvul. Lungent. Rachitis
5 w		Stellgs.- Anom.			20 zu 7	V-förmig	Scharlach, Mase
6 m	1. J.	Stellgs.- Anom. Bißanom.		alle Zähne rachitisch	18 zu 7	h. Gaum.	Kiefer Knochenh.-En Masern, Scharla
7 w				alle Zähne rachitisch	20 zu 7	"	Rach., Knochene
8 m		Stellgs.- Anom.			25 zu 4	"	Skoliose
9 m	1 1/2 J.				17 zu 6	"	Rachitis, Vat. S
10 m					28 zu 2	"	Konvul. Skol.
11 m					24 zu 4	"	Rachitis und Ma
12 m					26 zu 2	"	Rachitis, Konvul
13 m					20 zu 4	"	Masern, Keuchhu
14 w	1/4 J.	Stellgs.- Anom.			17 zu 5	"	
15 m		sehr kl. Prämolar. Stellgs.- Anom.				"	
16 m					28 zu 2	sehr hoh. Gaumen	Rachitis, Stamm
17 w				ob. u. unt. Frontz. Hyp.	21 zu 7	h. Gaum.	Ohnmächte
18 w		außeror- dentlich kräftige Stellgs.- Anom. off. Biß			25 zu 3	"	
19 w					23 zu 5	"	Kyphose
20 w	1 1/4 J.	Stellgs - Anom. Mikrog.			19 zu 8	"	Lungenentzündu Steinblattern
21 w					10 zu 18	"	
22 w		Stellgs.- Anom.			22 zu 3	"	Rachitis, Konvul
23 m		Stellgs.- Anom.			27 zu 1		Adenoide Wuchse
24 w					23 zu 5		Rachitis
25 m				Hypopl.		"	Rachitis
26 m				Hypopl.	20 zu 7	"	Ad. Wuch., Rach
27 m		Stellgs.- Anom.			20 zu 8	"	Rachitis

ll r.	Stö- rungen des Durch- bruchs der Zähne	Ano- malien der Zähne	Biß- Ano- malien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungs- zeit	Kariöse Zähne	Mißbil- dungen	Mitgen acht Erkrankungen
n	3. J.		Scheren- biß	o. u. u. Front- zähne rach.	20 zu 7	h. Gaum.	Mas., Keuchh., Rach , Stimmritzenkrampf
w	1 ³ / ₄ J.		Progen.		23 zu 5	"	Lungenentz., Keuch- husten, Rachitis
w	3/4 J.	Stellgs.- Anom.			25 zu 1	"	Masern, Keuchhusten, Scharlach, Grippe
m		Stellgs.- Anom.		o u u. Front- zähne rach.	21 zu 7	"	Masern, Rachitis
m					25 zu 3	sehr hoh. Gaumen	Mas., Keuchh., Rach., Mutt. Paralysis
w					17 zu 10	"	Rach., Skolios, Mas., Konvul.
m	3/4 J.	Schmelz- tropfen		Frontzähne rach.	21 zu 7	h. Gaum.	Rachitis, Grippe, Frei- sen, Mundatmung, Stotter
m					24 zu 3	hoh. eng. Gaumen	Lungenentzündung, Rachitis
w		Stellgs.- Anom.			26 zu 1	"	Lungenentzündung
m			Prognath.		17 zu 9		
m					28 zu 0	sehr hoh. eng. G.	Skoliose
w				Frontzähne rach	21 zu 7	h. Gaum.	Rachit., Keuchhusten, Masern
m			Aufbiß	Hypoplas.	24 zu 4	sehr hoh. Gaumen	Rachitis, Knickfuß
m	2. J.	Stellgs.- Anom.		alle Zähne rachitisch	21 zu 6		Rach., Nasenpolypen
w		Stellgs.- Anom.			25 zu 1		Rachitis, Lungenent- zündung, Kyphose
w	1. J			alle Zähne rachitisch	23 zu 5	h. Gaum.	Rachitis, Konvul., Lungenentzündung
w	2. J.				15 zu 3	"	Keuchh., Mas., Rach., Freisen
m	3/4 J.				20 zu 8	"	Vat. Trink., Rachitis
w					17 zu 11	"	Vater Trinker
w	3/4 J.				27 zu 1	sehr hoh. Gaumen	Rach., Mas., Lungen- entz., Mutter Tbc., Vater Trinker
m					26 zu 1	h. Gaum.	Scharlach, Keuchh.
m					26 zu 0	"	Rachitis
m	1 ¹ / ₂ J.	Schmelz- tropfen			22 zu 6	sehr hoh. Gaumen	Konvul., Brechdurch- fall, Rachitis, Mas., Keuchh., Lordose
m	2. J.		Scheren- biß		22 zu 4	"	Konvulsion., Rachitis, Stammler
w		Stellgs.- Anom.			24 zu 2	h. Gaum.	Mas., Keuchh., Lor- dose, Mundatmung, Zähneknirschen
w	3/4 J.		Scheren- biß		23 zu 4	sehr hoh. Gaumen	Mas., Grippe, Rachit., Lungenentzündung
w					23 zu 3	hoh. eng. Gaumen	Mas., Scharl., Dipht., Rachitis (Brust)
m					21 zu 7	h. Gaum.	Rachitis. Mutter Schnapstrinkerin

Fall Nr.	Störungen des Durch- bruchs der Zähne	Ano- malien der Zähne	Biß- Ano- malien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungs- zeit	Kariöse Zähne	Mißbil- dungen	Mitgemachte Erkrankungen
56 m	2. J.				24 zu 4	h. Gaum.	Rach., Mas., Keuchh.
57 m				Frontzähne rachitisch	19 zu 7	sehr hoch. Gaumen	Konvuls., Fro- Vater Trinker
58 m					26 zu 2	h. Gaum.	Masern, Rachitis
59 m			Makro- gnathie		23 zu 3	"	Mas., Steinbl., R
60 m	2. J.	Stellgs.- Anom.		Frontzähne rachitisch	25 zu 2	sehr hoch. Gaumen	Mas., Rachitis (F
61 m					21 zu 6	h. Gaum.	Keuchh., Lungen- zündung, Rachn
62 m					23 zu 4	"	Mas., Steinbl., Ke
63 w	1 ³ / ₄ J.			Frontzähne rachitisch	21 zu 7	Gaumen sehr hoch.	husten, Bronchi
64 m		7. l. o. 6 Höcker			25 zu 2	"	Vater Trinker
65 m	1. J.		Progenie	alle Zähne rachitisch	13 zu 9	"	Mas., Rach., Mum
66 m					24 zu 4	h. Gaum.	Knv., Keuchh., Br
67 m		4. l. u. Eckzahnf.			25 zu 3	sehr hoch. Gaumen	drchf., Rach.(Br
68 w	1 ¹ / ₂ J.				20 zu 8	h. Gaum.	Großvater Tri
69 m					20 zu 4	sehr hoch. Gaumen	Konvul., Mas., Ke
70 m		Stellgs.- Anom.			27 zu 1	"	husten, Lungen
71 w					26 zu 2	"	zdg., Rach., Star
72 w	1 ¹ / ₂ J.	1 r. u. Zapfenf. Stellgs.- Anom.			19 zu 3	h. Gaum.	Rach., Mas., Bro
73 w	1 ¹ / ₂ J.				26 zu 1	"	durchfall, Kyp
74 w			Scheren- biß		20 zu 7	"	Masern, Lungene
75 m					22 zu 6	"	Steinbl., Mittell
76 m		Stellgs.- Anom.			23 zu 5	"	entz., Mundatr
77 w					25 zu 3	sehr hoch. Gaumen	Stotterer
78 w	1 J.	l. u. r. o. 1 Kaffee- bohnen- ähnl. Spalt Stlgs.-An.			23 zu 5	"	Rach., Keuchhus

il	Störungen des Durch- bruchs der Zähne	Ano- malien der Zähne	Biß- Ano- malien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungs- zeit	Kariöse Zähne	Mißbil- dungen	Mitgemachte Erkrankungen
w				Frontzähne u. Sechser rachitisch	23 zu 4	h. Gaum.	Rachitis
m		Diastema			25 zu 3		Rach., Mas., Lungen- entzündg., Konvul.
m	2. J.				21 zu 3	sehr hoh. Gaumen	Rachitis, Ausschlag, Konvul.
m					20 zu 7	h. Gaum.	Rachitis, Masern, Lordose
w		Stellgs.- Anom.			26 zu 2	..	Stimmritzenkrampf, Rachitis
w					23 zu 5	..	Rachitis
w					22 zu 6	..	Konv., Scharl., Keuch- husten, Rach., Kyph.
m	1 1/2 J.				20 zu 7	sehr hoh. Gaumen	Rachitis, Mutter Tbc.
m					25 zu 3	h. Gaum.	Mas., Lungenentzdg., Keuchhusten, Rach.
w	1 J.				24 zu 4		Keuchh., Mas., Stein- blattern, Lungen- entzdg., Knochen- tbc., Stammler
m					20 zu 6	..	Keuchh., Rach., Gripp.
m	1. J.		Prognath.	alle Zähne rachitisch	25 zu 1	..	Mas., Keuchh., Rach.
m	2. J.				18 zu 10	..	Stimmritzenkrampf
m					25 zu 0		Rach., Konv., Lungen- entzdg., Keuchhust., Mutter Tbc.
m	1 1/2 J.		Prognath.		23 zu 4	..	Darmkat., Keuchh., Lungenentz., Kon., Rach., Artik. Gebr.
m		Stellgs.- Anom.			16 zu 6	..	Rachitis
w					19 zu 9	..	Masern, Rachitis, Vater Trinker
m				oben 1 rachit.	28 zu 0	..	Konvul., Lungenent- zündung, Rachitis
m				ob. Frontz. rachitisch	26 zu 2	..	Rachitis, Gelbsucht, Vater Lues
m	1/2 J.				23 zu 4	..	Mas., Keuchh., Kopf- grippe, Rachitis
m			off. Biß		25 zu 3	..	Konv., Mas., Keuchh., Dipht., Stammler
m	1 J.				24 zu 2	sehr hoh. Gaumen	Mas., Rach., Konvul., Kyph. II
m	1. J.				25 zu 3	h. Gaum.	Masern, Mundatmer, Stamml., schnarcht
w					25 zu 3	..	Mas., Mittelohrentzdg., Blinddarmreiz, Ge- hirnhautentzündg., Lungenentz., Rach.
w					24 zu 0		Hufschlag gegen Ge- hirn und Schädel

Fall Nr.	Sto- rungen des Durch- bruchs der Zähne	Ano- malien der Zähne	Biß- Ano- malien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungs- zeit	Kariöse Zähne	Mißbil- dungen	Mitgemachte Erkrankungen
104 m		6 r. o. 6 höckrig	Progenie	rachit. 6.	16 zu 3		
105 m	2. J.	Stellgs.- Anom.			8 zu 16	hoh. eng. Gaumen	Stimmritzenkran Rach., Brust- Augenk., Myx
106 m	$\frac{3}{4}$ J.				20 zu 6	h. Gaum.	Rach., Scharl., Mittelohrentz
107 m	2 J.	Stellgs.- Anom.			17 zu 7	" sehr hoh. Gaumen	Rachitis, Masern
108 w					19 zu 5		Lordose, Rachit
109 w					23 zu 4		Mumps, Lunge, K.
110 m	$\frac{1}{4}$ J.		Progenie		25 zu 3	h. Gaum.	husten, Masern
111 m		Stellgs.- Anom.			25 zu 1	hoh. eng. Gaumen	Rachit., Mundae Schnarcher
112 m	1 J.				19 zu 5	h. Gaum.	Masern, Rachiti
113 m			Progenie	alle Zähne rachitisch alle Zähne rachitisch	23 zu 4	sehr hoh. Gaumen	Mas., Keuchh., S bl., Rach., Munde Schnarcher, St
114 m	1 J.				17 zu 7	"	Mas., Rach., ad Wuch.
115 w					22 zu 3	h. Gaum.	Lungenentzdg., R lispelt
116 w					21 zu 7	"	Diphtherie, Rach
117 w	$1\frac{1}{2}$ J.				17 zu 8	"	Masern, Kyphos
118 m	$\frac{3}{4}$ J.				24 zu 3	sehr hoh. eng. G.	Masern, Keuchh
119 m	3 Mon.		Stellgs.- Anom.		20 zu 4	sehr hoh. Gaumen	Keuchh., Mas., R spricht schwer
120 w	1 J.				22 zu 3	"	Masern, Keuchhu pneumonie Ra
121 m	$1\frac{1}{4}$ J.				26 zu 2	h. Gaum.	Keuchh., Stimmri krpf., Konv., I
122 w				rachit. Frontzähne	22 zu 3	" " "	Mas., Scharl., K husten, Lunge
123 w	$1\frac{1}{4}$ J.				21 zu 6		zündung, Rach Konvulsionen
124 w	2 J.				21 zu 5		Masern, Rachiti
125 m	$\frac{3}{4}$ J.	Stellgs.- Anom.			13 zu 11	"	Rachitis, Konvu
126 m					22 zu 5	"	Scharl., Mas., Ste Rachitis, Kyph
127 w					26 zu 2	"	Masern, Rachit Neuropath
128 w	$1\frac{1}{2}$ J.				21 zu 4	"	Rachitis, Masern
129 m	1 J.				17 zu 6	"	Keuchh., Mas., r Hasenscharte, an
130 w					8 zu 14	sehr hoh. eng. G.	tig, Rachitis, Steinblatt., Lu
131 m		Stellgs.- Anom.	Prognath.		19 zu 7	"	Rachitis, Stamma
132 w			Progenie		24 zu 2	hoh. weit. Gaumen	Diphtherie, Rach Masern, Rachiti

	Störungen des Durch- bruchs der Zähne	Ano- malien der Zähne	Biß- Ano- malien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungs- zeit	Kariöse Zähne	Mißbil- dungen	Mitgemachte Erkrankungen
m	3/4 J.				28 zu 0	h. Gaum.	Masern, Keuchhusten, Rachitis
w					27 zu 1	hoh. gew. Gaumen	Rachitis, Masern
m				alle Front- zähne rach.	13 zu 11	sehr hoh. Gaumen	Masern, Stimmritzen- krampf, Rachitis
w	1. J.	Stellgs.- Anom.	Mikro- gnath.		19 zu 5	h. Gaum.	Keuchhusten, Rachitis
m					27 zu 0	..	Mumps, Mandelentz., Rach., Vater Tbc.
w					19 zu 8	..	Masern
m					12 zu 9	..	Masern, Rachitis
m		Stellgs.- Anom.			22 zu 6	..	Rachitis, Zähneknir- schen, Bettnässe
m					23 zu 5		Mas., Dipht., Rachitis
m			Aufbiß		22 zu 4	hoh. eng. Gaumen	Rachitis
w			Aufbiß		26 zu 2	h. Gaum.	Rachitis
w					26 zu 2	..	Masern, Mutter und Geschwister Tbc.
m					21 zu 4	..	epileptische Anfälle, Rachitis
m	3 J.			alle Zähne rachitisch	12 zu 8	sehr hoh. Gaumen	
m	1 1/2 J.				18 zu 6	h. Gaum.	Dipht., Mas., Rachitis, Lungenkart., Konv., stammelt
m	2 J.				22 zu 4		Rach., Mas., Keuchh.
m					24 zu 2	..	Lungenentzdg., Rach.
m	2 J.				19 zu 5	sehr hoh. Gaumen	Brechdurchf., Bronch. Lungenentzündung
w					18 zu 6	..	Rachitis
w					22 zu 4	h. Gaum.	Mas., Dipht., Halsent- zdg., Furunkulose, aden. Wucherung Mundatmer
m	1 1/2 J.				23 zu 1	..	Masern, Keuchhusten, schnarcht
w					22 zu 4	sehr hoh. Gaumen	Mas., Keuchh., Rach., Mundat., schnarcht
w					22 zu 6	h. Gaum.	Masern, Rachit., Vater Trinker
m		Zapfenf. 2. l. u.			26 zu 0	..	Rachitis
w	1 1/4 J.				23 zu 2	sehr hoh. Gaumen	Rachitis, Masern
w			off. Biß		24 zu 4	h. Gaum.	Mas., Scharl., Lordose, Keuchhusten, Rach.
w	1. J.	Stellgs.- Anom.			20 zu 6	sehr hoh. Gaumen	
w	1 J.				12 zu 12	..	Mas., Mandelentzdg., Rach., Sattelnase
w		Stellgs.- Anom.	off. Biß		20 zu 4	..	Mas., Lungenentzdg., Rach., Mundatmer

Fall Nr.	Störungen des Durchbruchs der Zähne	Anomalien der Zähne	Biß-Anomalien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungszeit	Kariöse Zähne	Mißbildungen	Mitgemachte Erkrankungen
162 w	1 J.	Stellgs.-Anom.	V-förm. Ob.-Kief.	Frontzähne rachitisch	26 zu 0	h. Gaum.	Masern, Rachitis
163 w	2 J.				18 zu 2	sehr hoh. Gaumen	
164 m					21 zu 4	hoh. eng. Gaumen	Mas., Dipht., Keuchh., Rachitis, Trinken familie, trinkt s
165 m		Stellgs.-Anom.	Mikrogenie		22 zu 4	sehr hoh. Gaumen	Mas., Steinbl., R Großeltern Tri
166 m					20 zu 5	h. Gaum.	Rach., Mas., ston Vater geisteskr suicid
167 w		Stellgs.-Anom.	V-förm. Ob.-Kief.		20 zu 4	sehr hoh. eng. G.	Masern, Lungen Rachitis
168 w	1/4 J.				13 zu 6	h. Gaum.	Mas., Keuchh., R Vater Trinker
169 w	1 1/4 J.				20 zu 4	"	Masern, Steinblas Gels., Konv., F
170 w	3/4 J.				20 zu 4	"	Rachitis, stamme
171 w					23 zu 4	"	Lungenentzdg., F
172 m	1. J.	Stellgs.-Anom.	V-förm. Ob.-Kief.		12 zu 10		Mas., Scharl., Ra Lungenentz., I
173 m					14 zu 7	"	Masern, Rachitis
174 w	3/4 J.				14 zu 7	sehr hoh. Gaumen	Masern, Steinblas Lungenentz., F
175 m					20 zu 4	h. Gaum.	Rach., Skol., Ky
176 m	1 1/2 J.				25 zu 0	"	Mas., Keuchh., K Lungenentz., R Lordose
177 m		Stellgs.-Anom.	Makrognath.		23 zu 2	sehr hoh. eng. G.	Rachitis
178 w	1/4 J.				17 zu 9	"	Mas., Keuchh., G Rach., Konv., S blattern, Neurc
179 w	1 J.				24 zu 1	h. Gaum.	Mas., Rach., Stam
180 m					18 zu 7		Masern. Rachitis, ter Trinker, gei krank
181 m					24 zu 4		Bronch., Lungen Rachitis, Freis
182 w		Stellgs.-Anom.			17 zu 7	hoh. eng. Gaumen	Mas., Keuchh., R Vater trinkt
183 w	3/4 J.				24 zu 2	h. Gaum.	Masern, Wasserp Rachitis
184 m					18 zu 6	sehr hoh. Gaumen	Rachitis, Konvul
185 w					23 zu 1	h. Gaum.	Mas., Scharl., Keu Rachitis, Stein
186 m					19 zu 5	"	Rach., Konvul., Keuchhusten
187 w					22 zu 2	"	Keuchhust., Ste Großmutter tr Mutter nerven

all r.	Stö- rungen des Durch- bruchs der Zähne	Ano- malien der Zähne	Biß- Ano- malien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungs- zeit	Kariöse Zähne	Mißbil- dungen	Mitgemachte Erkrankungen
w w	3/4 J.		Prognath.		18 zu 7 19 zu 5	h. Gaum. sehr hoh. eng. G.	Rachitis, Skol. Masern, Skrophulose, Rach., Mundatmer, schnarcht
w m	2. J.			Frontzähne rachitisch	17 zu 7 18 zu 6	h. Gaum. "	Rach., Mundatmer Lungenentzdg., Ge- hirnhautentzündg., schwerhörig
w m	1. J. 1 1/2 J.				18 zu 4 14 zu 8	sehr hoh. eng. G. sehr hoh. Gaumen	Masern, Keuchhusten, Rachitis Rach., Mas., Lungen- entzdg., Mandelent- zündg., Ohrenleid., Großvater Trinker
m m	1 1/2 J. 1 J.	Stellgs.- Anom.			22 zu 4 12 zu 11	h. schm. Gaumen sehr hoh. eng. G.	Mas., Keuchh., Lun- genentzdg., Rach. Rachitis
m m			V-förm. Kiefer Prognath.		18 zu 5		Masern, Keuchhusten, Rachitis, Stotterer
w w	1 1/2 J.				21 zu 3	h. Gaum.	Mas., Dipht., Keuch- husten, Rachitis
w m		Schmelz- tropfen	off. Biß		13 zu 9 12 zu 12	sehr hoh. eng. G. hoh. eng. Gaumen	Konvulsion., Rachitis, Keuchhusten Masern, Lungenentz., Rachitis
w m	1 1/2 J.		Progenie		12 zu 8		Rach., Keuchhusten, Röth., Scharlach
m m	1 3/4 J.				22 zu 2		Mas., Keuchh., Lung.- und Rippenfellentz.
m m					12 zu 7 20 zu 5	sehr hoh. Gaumen "	Mas., Steinbl., Rach., Lordose Masern, Lungenentz., Rach., Tbc., Schnar- cher, Mundatmer
w m	3/4 J.	Stellgs.- Anom.			14 zu 5	h. Gaum.	Mas., Bronch., Keuch- hust., Rach., Kyph., Skol., Mundatmer, Schnarcher
m m	2 J. 1 1/2 J.			Frontzähne rachitisch	20 zu 3 18 zu 6	" hoh. eng. Gaumen	Mas., Lungenentzdg. Mas., Scharl., Mumps, Rach., Dipht., Mund- atmer, Schnarcher
m w	1 1/4 J.	Stellgs.- Anom.			14 zu 4	"	Mas., Scharl., Lungen- entzündung, Rach.
w		Stellgs.- Anom.			19 zu 3	sehr hoh. eng. G.	Konv., Mas., Schnarch. I. Lungenentzündg., Rach., Grippe, Kch.- husten, Mundatmer, Rachitis, stammelt
m		Stellgs.- Anom.			20 zu 5	"	Schilddrüse

Fall Nr.	Stö- run- gen des Durch- bruchs der Zähne	Ano- malien der Zähne	Biß- Ano- malien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungs- zeit	Kariöse Zähne	Mißbil- dungen	Mitgemachte Erkrankungen
210 w	1 1/2 J.	Stellgs.- Anom.			19 zu 5	sehr hoh. eng. G. h. Gaum.	Rach., Mas., Keuchh., Rippenfellentzünd.
211 w	1 J.				12 zu 10		Rach., Skrof., Masern, Keuchh., Scharlach
212 w	1 J.				16 zu 8	"	Rach., Mas., Konv., Keuchh.
213 w	2 J.				18 zu 6	"	Rach., Masern, Keuchhusten, Rach.
214 m	1 1/4 J.				21 zu 2	"	Rach., Lungenentzünd., Mundart.
215 w	1 J.	Stellgs.- Anom.			14 zu 3	"	Mas., Keuchh., Rach.
216 w					14 zu 1	sehr hoh. Gaumen	Rachitis. Konv., Masern, Keuchhusten
217 m		Stellgs.- Anom.			24 zu 0	"	Mas., Rach., Mundatmer, Lordosen
218 w					10 zu 12	"	Mas., Dipht., Keuchh., Lungenentzünd.
219 m	1 1/4 J.	Stellgs.- Anom.			17 zu 3	sehr hoh. schm. G. Faltentz.	Mas., Lungenentzünd., Mumps, Rachitis
220 m					16 zu 3	h. Gaum.	Rachitis
221 m					19 zu 2	"	Keuchh., Mas., Rach.
222 w					17 zu 1	sehr hoh. Gaumen	Mas., Steinbl., Scharlach, Mumps, Rach., Konv.
223 w	1 J.				14 zu 7	h. Gaum.	Keuchh., Rach., Mandelentzünd.
224 w		Stellgs.- Anom.			18 zu 6		Mas., Steinbl., Rach., Skol.
225 m	1 J.				11 zu 12	sehr hoh. eng. G.	Rach., Mas., Keuchh., Lungenentzünd.
226 w					18 zu 6	h. Gaum.	Rach., Konv., Frischd.
227 m	3/4 J.				17 zu 6	"	Brechdurchf., Lungenentzünd., Halsentzünd., Rachitis, Mundart.
228 m	1 J.				16 zu 6	"	Mas., Rach., Stirnritzenkr., Freise.
229 m		Stellgs.- Anom.			16 zu 5	"	Masern, Rachitis
230 m	1/2 J.				24 zu 0	"	Bronchitis
231 m	1 1/2 J.				17 zu 6	"	Mas., Keuchh., Dipht., Rach., Konv., Blinddarmentzündung
232 m		Stellgs.- Anom.			21 zu 3	sehr hoh. Gaumen	Steinbl., Keuchh.
233 m					18 zu 4	"	Rach., Konv., Masern, Lungenentzündung, Grippe, Scharlach, Wat. u. Mutter T.
234 m	2 J.	Stellgs.- Anom.	Scheren- biß		14 zu 9	"	Masern, Skrof.
235 w	3/4 J.				14 zu 7	"	Mas., Rach., Steinbl.
236 w	1 1/2 J.				12 zu 12	"	Rachitis, Masern

Alter	Störungen des Durchbruchs der Zähne	Anomalien der Zähne	Biß-Anomalien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungszeit	Kariöse Zähne	Mißbildungen	Mitgemachte Erkrankungen
1 w		Stellgs.-Anom.			16 zu 4	sehr hoh. eng. G.	Rachitis, Lordose
2 m					15 zu 7		Mas., Mumps, Scharl., Rach., Vater Tbc.
3 m	2 J.				13 zu 4	h. Gaum.	Nierenleiden, Mas., Scharl., Dipht., Mutter Tbc., Schnarch.
4 m		Stellgs.-Anom.			22 zu 4	"	Masern, Vater trinkt
5 w					18 zu 0		
6 m					17 zu 3	hoh. eng. Gaumen	Masern, Rachitis
7 w	$\frac{3}{4}$ J.				10 zu 5	sehr hoh. eng. G.	Mas., Dipht., Mumps, Rachit., Mundfäule
8 m	1 J.			alle Milch- u. Frontzähne rachitisch	14 zu 10	sehr hoh. Gaumen	Rachit., Keuchhusten, Mundatmer
9 m	2 J.				10 zu 2	hoh. eng. Gaumen	Rach., Konvul., Mas., Steinbl., Keuchh., Mumps
10 w	$1\frac{1}{2}$ J.				16 zu 8	sehr hoh. eng. G.	Mas., Rachit., Skol., Mundat., Schnarch.
11 w	$\frac{3}{4}$ J.				19 zu 3	h. Gaum.	Mas., Steinbl., Lungenentzündg., Keuchh., Rachitis, Mundatm.
12 w			V-förm. Kiefer		15 zu 6	hoh. eng. Gaumen	Masern, Keuchhusten, Rachitis
13 m	$\frac{3}{4}$ J.				14 zu 7	h. Gaum.	Masern, Keuchhusten, Scharlach, Rachitis
14 m			Mikro-genie		15 zu 4	sehr hoh. Gaumen	Mas., Scharl., Keuchh., Rach., Lungenentz., Kyph., Skol.
15 w					15 zu 5	h. Gaum.	Scharl., Keuchhusten, Rachitis
16 w	$\frac{3}{4}$ J.				17 zu 7	"	Keuchh., Lungenentz., Konvul., Rachitis
17 w		Stellgs.-Anom.			14 zu 3	sehr hoh. Gaumen	Mas., Mittelohreiterg., Stotterer, stammelt
18 m		Stellgs.-Anom.	V-förm. Kiefer Makro-gnath.		15 zu 9	h. Gaum.	Masern, Keuchhusten, Rachitis, Konvul., stottert, Mundatm., Schnarcher
19 m					13 zu 10	sehr hoh. Gaumen	Rachitis
20 m					11 zu 9	"	Masern, Rachitis
21 w	$\frac{3}{4}$ J.	Stellgs.-Anom.		Milchzähne und o. l. rachitisch	10 zu 13	h. Gaum.	Mas., Keuchh., Rach.
22 w	1 J.				7 zu 12	hoh. eng. Gaumen	Keuchh., Rach., Mundatmer, schnarcht, Vater Lues?
23 w	1 J.				14 zu 10	h. Gaum.	Rachitis, Keuchhusten
24 m					11 zu 7		Masern, Steinblattern, Keuchhusten

Fall Nr.	Stö- rungen des Durch- bruchs der Zähne	Ano- malien der Zähne	Biß- Ano- malien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungs- zeit	Kariöse Zähne	Mißbil- dungen	Mitgemachte Erkrankungen
261 w					19 zu 4	h. Gaum.	Masern, Lungen- stamm., Vater
262 m	$\frac{3}{4}$ J.				15 zu 8	sehr hoh. Gaumen	Rach., Mas., B durchfall, Sko
263 m			Progenie		19 zu 4	h. Gaum.	Rachitis, Mund
264 m					8 zu 7	sehr hoh. Gaumen	Rachitis
265 w	$\frac{3}{4}$ J.	Stellgs.- Anom.			14 zu 5	h. Gaum.	Masern, Keuchhu herzleidend
266 m					18 zu 4		Rach., Lungenkat Mas., Lähmun r. Armes u. F Mundat., Stam Mutter beschu
267 m	1 J.	Stellgs.- Anom.			15 zu 8	sehr hoh. Gaumen	Rachitis
268 w	2 J.				24 zu 0	h. Gaum.	Rach., Mas., Keu Dipht.
269 m	1 J.				21 zu 1	"	Rach., Scharl., Kyphose
270 m	$1\frac{1}{2}$ J.				14 zu 7	"	Mas., Keuchh., R Scharl., Kou ter Tbc., Stam
271 w					20 zu 4		Rachitis
272 w					18 zu 5	"	Vater trinkt
273 w	1 J.				15 zu 9	hoh. eng. Gaumen	Rach., Scharl., Keuchhusten,
274 w	1 J.	Stellgs.- Anom.			10 zu 6	sehr hoh. eng. un- sim. G.	Masern, Keuchhu Rachitis
275 m					18 zu 6	h. Gaum.	Bronch., Keuchh Masern, Rachi
276 m	$1\frac{1}{4}$ J.				11 zu 10	"	Konv., Keuchhu Masern, Rachi
277 m	$\frac{3}{4}$ J.	Stellgs.- Anom.			17 zu 6	"	Masern, Rachitis
278 m					16 zu 8	sehr hoh. Gaumen	Mas., Keuchh., S blattern, Mund
279 m	4 Mon.	Stellgs.- Anom.			20 zu 4	"	Keuchh., Mas., Mu Konvul., Rach
280 w					18 zu 3	h. Gaum.	Masern, Lungent Rachitis
281 m					19 zu 3	"	Mas., Keuchh., F
282 w	1 J.	Stellgs.- Anom.			19 zu 4	"	Rach., Mas., Flec
283 w					16 zu 8	"	
284 m					16 zu 6	"	Masern
285 w	2 J.	Stellgs.- Anom.			22 zu 1	"	Skol., Rachitis
286 w	$1\frac{1}{4}$ J.				17 zu 6	"	Rachitis, Kyph.
287 w		Stellgs.- Anom.			18 zu 5	sehr hoh. Gaumen	Masern, Keuchhu
288 m	$\frac{3}{4}$ J.	Stellgs.- Anom.			15 zu 8	h. Gaum.	Rachitis, Masern

Störungen des Durchbruchs der Zähne		Anomalien der Zähne	Biß-Anomalien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungszeit	Kariöse Zähne	Mißbildungen	Mitgemachte Erkrankungen
n	1 J.				15 zu 6	h. Gaum.	Konvul., Mundatmer, Schnarcher
n	2 J.				14 zu 10		Mas., Keuchh., Rach., Konv., Mundatmer
w		Stellgs.-Anom.	Aufbiß		13 zu 5	..	Rach., Konv., Stimmritzenkrampf, Mas., Scharl., Mups., M. epileptisch
n		Stellgs.-Anom.			16 zu 8	..	Konvul., Rachitis
w					16 zu 2	..	Masern, Steinblattern, Mundatmer
w	1 1/2 J.	Diast.			18 zu 6	..	Rach., Konvul., Mas.
w	1 1/2 J.				12 zu 8	hoh. eng. Gaumen	Mas., Keuchh., Rach.
m	1 1/2 J.				19 zu 5	h. Gaum.	Rachitis, Masern
m	1 J.	Stellgs.-Anom.			13 zu 11	..	Rach., Mas., Keuchh.
m	1 J.	Stellgs.-Anom.			16 zu 8	..	Rachitis, Masern
w	3/4 J.				15 zu 3	sehr hoh. Gaumen	Mas., Rach., stammelt
w					18 zu 6	h. Gaum.	Masern, Keuchhusten
m	1 J.				13 zu 9	..	Mas., Keuchh., Rach., Vater trinkt
w					18 zu 5	..	Mas., Keuchh., Scharl., Konvul., Rachitis
m	3/4 J.	Stellgs.-Anom.	V-förm. Kiefer		15 zu 8	sehr hoh. Gaumen	Rachitis, Keuchh.
w		Stellgs.-Anom.			13 zu 8	h. Gaum.	Mas., Keuchh., Rach.
m					23 zu 1	hoh. eng. Gaumen	Rach., Ohrenerkrankung
m					12 zu 8	h. Gaum.	Mas., Keuchh., Scharl., Skrof., Rachitis
m	3/4 J.				15 zu 4	hoh. eng. Gaumen	Mutter gemütskrank, Rachitis
w	3/4 J.	Stellgs.-Anom.	off. Biß		8 zu 11	sehr hoh. eng. G.	Mundatmer, Schnarch.
m	2 1/2 J.				6 zu 10	h. Gaum.	Mas., Lungentzündg., Konvul., Rachitis, Mundatmer
m	1 J.				12 zu 10	..	Mas., Keuchh., Rach., Lungenentz., Scharl.
w					10 zu 14	hoh. eng. Gaumen	
w					23 zu 1	..	Masern, Rachitis
m	3/4 J.			ob. Frontz. rachitisch	21 zu 2	sehr hoh. Gaumen	Mas., Keuchh., Konv., Rachitis
m	3/4 J.				18 zu 6	..	Rach., Konv., Epil.
w		Stellgs.-Anom.			14 zu 10	..	Mas., Mandelentzdg., Stammler
w		Stellgs.-Anom.	Aufbiß		21 zu 2	h. Gaum.	Rachitis, Masern

Fall Nr.	Stö- rungen des Durch- bruchs der Zähne	Ano- malien der Zähne	Biß- Ano- malien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungs- zeit	Kariöse Zähne	Mißbil- dungen	Mitgemachte Erkrankungen
317 m	1/2 J.				15 zu 9		Mas. Scharl., Keuchh., Lungenentzündg., Schielen
318 m					18 zu 6		Mas., Rach., Kyphos.
319 m	2 J.	Stellgs.- Anom.			21 zu 1	h. Gaum.	Rachitis
320 m					16 zu 4	"	Mas., Scharl., Masern, entzündg., Misch- Rach., Mund- Rachitis
321 w		Stellgs.- Anom.			13 zu 10	"	Rachitis
322 m	1 J.			Frontzähne rachitisch	10 zu 13	"	Mas., Keuchh., So- Konvul., Rachitis
323 m	1 J.			Frontzähne rachitisch	7 zu 10	sehr hoh. Gaumen	Rachitis, Masern
324 m	1 J.				14 zu 7	"	Mas., Grippe, E- Mundat., Schnarcher
325 m					17 zu 4	h. Gaum.	Mas., Rach., Ko- Scharlach
326 m	1 1/2 J.			alle Zähne rachitisch	12 zu 11	"	Mas., Keuchh., T- Rachitis
327 m	1 J.				10 zu 7	sehr hoh. eng. G.	Rachitis, Masern
328 m	1 J.				11 zu 7	"	Scharl., Mas., D- Keuchh., Ko- Stimmritzenk- Drüseneitg., Rach., Konv., Lu- entzündung
329 w					17 zu 3		Masern, Rachitis
330 m	1 J.				17 zu 7	h. Gaum.	Mas., Rach., Lu- katarrh
331 w	3/4 J.		Progenie		13 zu 7	sehr hoh. Gaumen	Masern, Keuchh., Pneum., Steinh- Rach., Munda- Schnarcher
332 m		Stellgs.- Anom.			15 zu 8	"	Mandelentz., Ob- Steinbl., Ra- Mundat., Schn- Mas., Darmkar- Steinbl., Rach- Stimmritzenk., Keuchh., Lu- entzündg., Ko- Rachitis, Sko- Mundatm., schn
333 w	1 J.				15 zu 6	hoh. eng. Gaumen	
334 w	2 J.			alle Zähne rachitisch	19 zu 2	sehr hoh. Gaumen	
335 m	1 1/2 J.			1 oben rachitisch	8 zu 13	"	
336 m		Stellgs.- Anom.			17 zu 7	"	
337 m				obere 6er rachitisch	14 zu 8		Rachitis
338 w	3/4 J.	Stellgs.- Anom.	off. Biß		10 zu 8	"	Mas., Rach., Mu-
339 w					16 zu 6		Mas., Rachit., I-
340 m					15 zu 9	h. Gaum.	Hinterkopfverle-
341 w					19 zu 4	"	Mas., Keuchh., M-

Störungen des Durchbruchs der Zähne		Anomalien der Zähne	Biß-Anomalien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungszeit	Kariöse Zähne	Mißbildungen	Mitgemachte Erkrankungen
n					12 zu 11	sehr hoh. Gaumen	Rachitis
n		Stellgs.-Anom.	off. Biß	sämtl Zähne rachitisch	10 zu 8	sehr hoh. schm. G.	Schnarcher, Masern, Rachitis
n	7 J.	Stellgs.-Anom.			12 zu 12	h. Gaum.	Rachitis, Mundatmer
w		Stellgs.-Anom.			17 zu 5		Rach., Mas., Steinbl., Bronchitis
ni			gesperrt. Biß		23 zu 0	sehr hoh. Gaumen	
w					14 zu 8	h. Gaum.	Rachit., Keuchhusten, Brechdurchf., Mas., Stammer
m	1 1/2 J.			Milchzähne rachitisch	9 zu 11	..	Rachitis, Scharlach, Psychopath
w					21 zu 3		Masern, Keuchhusten, Konvul., Rachitis, X-Beine
m	1 J.	Stellgs.-Anom.			15 zu 8	sehr hoh. eng. G.	Pneum., Stimmritzenkrampf, Rach., Skol.
m					16 zu 6	sehr hoh. Gaumen	Rachitis
m	1 J.				19 zu 4	sehr hoh. eng. G.	Mas., Scharl., Keuchhusten, Mumps
m					21 zu 2	..	Mas., Mumps, Rach.
w					11 zu 9		Scharl., Keuchhusten, Rachit., chronische Mittelohreiterung
m				Frontzähne rachitisch	12 zu 11	h. Gaum.	Masern, Keuchhusten
w					19 zu 3	..	Rachitis
m		Stellgs.-Anom.			8 zu 10	..	Masern, Keuchhusten
m					12 zu 11	..	Bronchitis
m					10 zu 10	..	Masern, Rachitis
w		Stellgs.-Anom.			12 zu 4	..	Mas., Steinbl., Rach., endekr. St
m					18 zu 5	..	Rachitis
w	1 J.	Stellgs.-Anom.			10 zu 12	sehr hoh. eng. G.	Rach., Mas., Lungen- und Rippenfellentzündung, Mundatmer, Schnarcher
m					14 zu 3	h. Gaum.	
m		Stellgs.-Anom.			15 zu 9	sehr hoh. Gaumen	Brechdurchfall, Mas., Scharlach, Rachitis
m					13 zu 9	..	Myxödem
w					13 zu 11		Keuchh., Mas., Rach., Steinb'attern
m	2 J.	Stellgs.-Anom.			6 zu 13	h. Gaum.	Masern, Mutter Lues, Vater Tbc.
w	1 J.				20 zu 4	..	Rach., Keuchh., Konv., Mas., Lungenentz.
m	1 J.				15 zu 6	sehr hoh. Gaumen	Masern, Rachitis

Fall Nr.	Stö- rungen des Durch- bruchs der Zähne	Ano- malien der Zähne	Biß- Ano- malien	Schädigungen der Zähne während der Entwicklungs- zeit	Kariöse Zähne	Mißbil- dungen	Mitgemachte Erkrankungen
370 m		Stellgs.- Anom.			9 zu 15	sehr hoh. Gaumen	Masern, Scharl.
371 m	1 J.				15 zu 6	h. Gaum.	Rachitis Scharl., Dipht.
372 m	$\frac{3}{4}$ J.	Stellgs.- Anom.			12 zu 10	sehr hoh. eng. G.	Epil., Rachitis Masern, Konv., ausschlag, Ra- mundatm., Sc- cher
373 w	$\frac{3}{4}$ J.				17 zu 7	h. Gaum.	Masern, Steinblä- Blasenleiden, genentzdg., I Eltern Tbc.

den folgenden Erörterungen sei in Kürze auf die in der Tabelle niedergelegten Daten im Zusammenhang eingegangen.

Vorkommen einer anormalen Dentition, wenn wir darunter zunächst verfrühtes oder verspätetes Zahnen verstehen, ist bei den Hilfsschülern häufig. Es ist natürlich sehr schwer, im einzelnen Falle über die Ursachen zu forschen. Der Grund eines verfrühten Zahndurchbruches, wie wir ihn in 8 Fällen von 372 feststellen können, kann einmal in einer vorzeitigen Zahnanlage mit nachfolgender normaler Entwicklung oder einer normalen Zahnanlage mit beschleunigtem Wachstum in irgend einer späteren Fötalperiode oder endlich eine oberflächliche Lagerung des Zahnsäckchens, der Folge die schon halbfertigen und noch wurzellosen Zähne bereits durchbrechen und im Zahnfleisch sitzen, zu suchen sein. Meines Erachtens liegt die Ursache des verfrühten Zahndurchbruches hier wesentlich in Störungen der inneren Sekretion, indem hier frühzeitig pathologische Wachstumsimpulse ausgelöst werden. Man neigt heute vielfach zur Ansicht, für die Dentition ein besonderes Gehirnzentrum verantwortlich zu machen. Da bei den betreffenden Kinder nachweislich Schädigungen gewisser Gehirnpartien vorweisen, wäre es durchaus denkbar, daß dieselben Insulte auch das mutmaßliche Dentitionszentrum gestört hätte. Sehr häufig ist dagegen bei Hilfsschülern zu spätes Zahnen. Ich habe den Eindruck gewonnen, daß bei Hilfsschülern die weitaus häufigste Ursache des verspäteten Zahnens in gewissen konstitutionellen Krankheiten, besonders in der Rachitis liegt, worauf schon eine andere Autoren hingewiesen haben, dabei will ich in diesem Zusammenhang auf die Rachitis nicht näher eingehen. Man macht namentlich in der Zahnkunde die Rachitis für viele Dinge verantwortlich, was allerdings nicht immer mit Recht geschieht. Auch hier scheinen mir Störungen innersekretorischer Systeme und direkte Gehirnschädigungen wesentlich mitzuspielen.

Malokclusionen der Zähne scheinen bei Hilfsschülern nicht häufiger zu sein, als bei gesunden Kindern. Überzählige Höcker wurden in 4 Fällen gefunden. Über die Ursache dieser Höcker ist man noch nicht über die Theorie hinausgekommen. Überzählige Zähne fand ich in der Morlarengegend bei 10 Individuen.

Malokclusionen der Zähne scheinen bei Hilfsschülern relativ häufig zu sein. Ich fand in 12 Fällen, daß der als anormal zu bezeichnende Zahn in der Zahnreihe stand, sich dabei aber um eine vertikale Achse gedreht hatte. In 16 Fällen befand sich der Zahn außerhalb der Zahnreihe, jedoch unmittelbar an jener Stelle des Zahnbogens, wo er hingehörte. In 6 Fällen befand sich der betreffende Zahn an einem seiner natürlichen Durchbruchsstellen an einem entlegenen Orte zum Vorschein. Da erfahrungsgemäß derartige Malokclusionen häufig erblich sind und sich durch Generationen hindurch nachvererben lassen, handelt es sich hier sicher zum größten Teil um Vererbung. Die Hilfsschüler stammen ja meist von Eltern ab, die selbst alle möglichen körperlichen und geistigen Minderwertigkeiten und Anomalien aufweisen. Das aber letzten Endes die Ursache für all dies abgibt, kann hier nicht erörtert werden.

Malokclusionen sind bei Hilfsschülern ebenfalls häufig anzutreffen. Progenie wurde in 6, Prognathie in 5, Opisthogenie in 4 und Opisthognathie in ebenfalls 4 Fällen beobachtet. Scherenbiß fand sich in 7 Fällen. Das besagt also, daß in insgesamt 26 von 372 Fällen Bißanomalien bestanden. Sicherlich

sind diese Anomalien auf Störungen der Knochenentwicklung in der Linie zurückzuführen, da sie meist vergesellschaftet mit anderen Knochenmißbildungen auftraten. In 24 Fällen besteht Kyphose bzw. Skoliose, in weiteren 3 Fällen bestehen Knochenveränderungen auch am übrigen Schädel. Schon Greve hat darauf hingewiesen, daß Störungen der normalen Schädelentwicklung, etwa ein Zurückbleiben der Entwicklung der Schädelknochen, bei Hilfsschülern Anomalien des Kiefers zum Teil nach sich ziehen bzw. mit ihnen vergesellschaftet sein können. Der Großteil dieser Kiefermißbildungen tritt schon intrauterin auf. Wir wissen, daß der Unterkiefer während des Embryonallebens eine merkwürdige Entwicklung mitmacht. Es steht fest, daß Ober- und Unterkieferwachstum während der Embryonalentwicklung auffallend disharmonisieren. So ist bei einem Embryo von 21,6 mm Körperlänge der Kiefer prognath, bei 43,3 mm progn und bei 91,5 mm Körperlänge wieder prognath. Die Ursache für dieses wechselnde Verhalten des Unterkiefers geht mit der Bildung des Gaumengewölbes einher. Während nämlich in einem frühen Embryonalstadium die Zunge noch den ganzen Nasen-Mundraum einnimmt, — in diesem Stadium ist der Kiefer prognath —, steigt sie bald darauf durch die Bildung des Gaumengewölbes nach abwärts, wodurch ein Wachstumsimpuls auf den Unterkiefer ausgelöst wird. Wenn diese Korrelation irgend wie gestört wird, sei es dadurch, daß die betreffenden Wachstumsimpulse nicht rechtzeitig ausgelöst werden, oder daß Anomalien des Knochengewebes selbst vorliegen, treten Mißbildungen der oben beschriebenen Art auf. Freilich können auch durch Wachstumsveränderung des kompletten Milchgebisses und durch Störungen in der zweiten Dentition noch Kieferanomalien entstehen. Uns scheinen mir diese bei Hilfsschülern auch nicht häufiger als sonst.

Schädigungen der Zähne während der Entwicklung im Sinne der Hypoplasien sind bei Hilfsschülern zahlreich. Sie konnten bei 78 Schülern nachgewiesen werden. Man bezeichnet diese Hypoplasien gemeinhin als Defekte, die auf rachitischer Basis entstanden sind. Wir wissen aber, daß die Rachitis kein Krankheitsbegriff *suigeneris* darstellt. Wir sehen daher auch in den Hypoplasien nur mehr ein Krankheitssymptom, das aber von den verschiedensten Schädigungen, die zum Teil auf der inneren Sekretion, auf Störungen des Stoffwechsels oder Störungen der Zahngewebe selbst beruhen. Ein gewöhnlicher Darmkatarrh, wie ihn ja viele Säuglinge durchmachen, schädigt den Kalkstoffwechsel in vielen Fällen ebenso sehr, wie die eigentliche Avitaminose, die wir als Englische Krankheit im engeren Sinne bezeichnen. Umgekehrt braucht nicht jede Avitaminose sich an den Zähnen bemerkbar machen. Unter den Hilfsschülern befanden sich eine große Anzahl, die eine Englische Krankheit durchgemacht hatten und keine Hypoplasien an den Zähnen aufwiesen. Weiterhin können derartige Hypoplasien auch durch Infektionen hervorgerufen werden. Wir wissen, daß auch bei Lues Hypoplasien auftreten können. Ich konnte allerdings luetische Veränderungen der Zahnstruktur nur in 4 Fällen nachweisen, obwohl bei 17 Kindern nachweislich eine kongenitale Lues vorlag. All dies deutet darauf hin, daß bei dem Entstehen von Schmelzhypoplasien eine Vielheit von Bedingungen vorliegen muß, um diese Veränderung zustande kommen zu lassen. Da im allgemeinen aber diese Hilfsschüler Störungen der Entwicklung, Störungen der inneren Sekretion, Keimschädigungen, Infektionen zum großen Teil mitgemacht haben, ist es natürlich, daß diese Schädigungen sich auch im Bau des Zahns

umentieren, wenn freilich nicht immer ein Umstand allein, sondern gerade Vielheit von Bedingungen zu ihrem Zustandekommen notwendig war. Einbar paradox dagegen ist das Auftreten von Zahnkaries bei Hilfsschülern im Gegensatz zu normalen Kindern. Das auffälligste an den Untersuchungen der Nürnberger Hilfsschüler war, daß man den Eindruck gewann, unter ihnen die Zahnkaries lange nicht den verheerenden Umfang genommen hatte, wie bei normalen Kindern. Dieser oberflächliche Eindruck spiegelt sich in den Tabellen auch zahlenmäßig deutlich wieder. Von 338 Kindern wiesen 46 vollkommen gesunde Zähne auf. 338 hatten nur leichtere Defekte, wobei 2 bis 4 Zähne kariös waren. Nur ein verschwindender Rest 34 Kinder hatten schwere, kariöse Veränderungen der Zähne. Von Greve, Gebhardt, Frenzel haben diese Tatsache festgestellt. Man konnte den Eindruck gewinnen, daß die Natur diesen Kindern auf der einen Seite im Übermaß das schenkt was sie ihnen auf der andern versagt. Meines Erachtens liegt aber die Ursache für diesen besonderen Befund folgendem. Wir haben es bei Hilfsschülern mit Kindern zu tun, die wohl in mancher Richtung hin schwere Defekte aufweisen, die aber und das was wir berücksichtigen, diese Schädigungen wohl nie überstanden hätten, wenn in ihnen nicht eine ganz besondere vitale Energie vorhanden wäre. Die allgemeine Gesundheitslage, von den Defekten abgesehen, ist nämlich bei diesen Kindern durchaus keine schlechte. Daher nimmt es nicht wunder, daß wir in einem großen Teil der Fälle ausgesprochen kräftige und gesunde Gebisse vorfinden. Man könnte dem entgegenhalten, daß auch Untersuchungen bei erwachsenen Geisteskranken gerade das Gegenteil der Erfahrung gebracht hätten. Dort hat nämlich die Zahnkaries einen schreckenden Umfang. Aber die Ursache dafür liegt sicher in äußeren Momenten, indem es bei diesen Kranken an der notwendigen Pflege und Ernährung der Zähne fehlt.

Relativ häufig wurde der Befund eines hohen Gaumens angetroffen. Es ist durchaus fraglich, ob wir jeden hohen Gaumen als pathologisch, meist auf rachitischer Basis entstanden, ansprechen dürfen. Der hohe Gaumen ist in der Mehrzahl der Fälle nicht pathologisch, sondern ein Teil der Proptoprosopie. Ohne genaues Studium des gesamten Schädelbaues darf also keine Diagnose pathologischer Gaumenbildung gestellt werden. Wenn wir von diesem Gesichtspunkt ausgehen, sinkt die Zahl der Gaumenanomalien bei Hilfsschülern ganz beträchtlich herab, bleibt aber immer noch über dem Durchschnitt bei normalen Schülern. Die Ursachen für die pathologische Gaumenbildung sind sicherlich mehrfacher Art. Greve glaubt, daß die erwähnten Gaumenverbildungen vielfach auf einer Verbildung des Schädels mit gleichzeitiger Deviation der Nasenscheidewand und der anliegenden Knochenpartien herrühren. Nach Danziger entstehen wenigstens ein Teil der Irregularitäten des Mittelgesichtes durch eine vorzeitige Verwölbung der an das Felsenbein liegender, sowie anderer Knochennähte. Die Grundursache dürfte in innersekretorischen Störungen zu suchen sein. Wenn nun durch irgend welche Umstände nach dieser Richtung eine Besserung konstitutioneller Verhältnisse eintritt, so ist es leicht denkbar, daß bei dem später einsetzenden Wachstum des Mittelgesichtes (Entwicklung und Durchbruch der bleibenden Zähne) nunmehr ein normales Wachstum dieser Teile eintritt, wodurch alsdann ein Mißverhältnis zu den früheren Ausbildungsverhältnissen eintritt. Die vielfach vertretene

Ansicht, daß in dieser Beziehung Rachitis eine ursächliche Rolle spielen soll, ist mit großer Vorsicht aufzunehmen. Soviel scheint sicher zu sein, daß gerade der sogenannte hohe Gaumen äußerst selten, um nicht zu sagen garnicht mit Rachitis kombiniert erscheint. Man kennt wohl die sogen. rachitische Kieferform. Diese äußert sich aber ganz anders, nämlich so, daß der Unterkiefer mehr oder minder trapezförmig verbogen erscheint, während der Oberkiefer den Unterkiefer schief spitzbogenförmig überlagert. Welche Rolle hierbei der Einwirkung der Kiefermuskulatur auf die angrenzenden nachgiebigen Knochen zukommt, oder ob nicht andere Kräfte wirksam sind — diese Frage ist keineswegs endgültig entschieden.

Es gehört nicht zu meiner Aufgabe, diesen sehr schwierig zu beurteilenden Fragen weiter nachzugehen.

Zusammenfassend läßt sich folgendes sagen. Der Zahn-Kieferbefund der Hilfsschüler ist im Großen gesehen nicht schlechter als der für normale geltende Kinder. Die Kariesfrequenz ist bei Hilfsschülern wesentlich geringer. Schmelzhypoplasien und Kieferanomalien sind dagegen bei Hilfsschülern häufiger vorhanden. Geisteskrankheiten scheinen keinen direkten Einfluß auf das Zahn-Kiefersystem auszuüben. Störungen der inneren Sekretion scheinen dagegen sich am Zahn-Kiefersystem stärker bemerkbar zu machen. Wenigstens finden wir bei Störungen der Schilddrüse, Störungen der Nebenschilddrüse und anderen Drüsen der inneren Sekretion, Veränderungen sowohl im Zahn, als auch in der Form und Größe und Beschaffenheit des Zahnbogens.

Ich habe eingangs der Arbeit auf die engen Beziehungen zwischen innerer Medizin und Zahnheilkunde hingewiesen, und es ist auch Zweck dieser Untersuchungen gewesen, dies an Hand des vorliegenden Materials erweisen nachzuweisen. Die Beziehungen beider Fachwissenschaften zueinander sind aber viel kompliziertere als gemeinhin angenommen wird. Es ist mir immer so, daß eine Rachitis am Zahnkiefersystem Veränderungen hervorruft. Es gehört wahrscheinlich eine Vielheit von Bedingungen zur Auslösung solcher Veränderungen. Erst im genauen Studium all dieser Einzelkomponenten und in der Untersuchung des gesamten Organismus mit all seinen Organen und Lebensäußerungen ist das Geheimnis des Verstehens der Veränderungen im Zahn-Kiefersystem begründet. Es ist daher dringend notwendig, daß die Zahnheilkunde sich immer enger an die Allgemeine Medizin anlehnt bzw. in sie übergeht.

eratur-Verzeichnis

- ve. Ergebnisse einer zahnärztlichen Untersuchung von 84 Kindern der Magdeburger Hilfsschulen.
- eff. Handbuch der Zahnheilkunde, Bd. 5.
- ubitzer. Ein Beitrag zur Statistik der Caries dentium auf Grund einer Untersuchung in der Städt. Schulzahnklinik Nürnberg.
- inzona. Einfluß der Schwangerschaft auf die Gebilde der Mundhöhle. D. m. f. Z. 1905.
- ten. Über die Häufigkeit der Karies bei Schulkindern und ihre Beziehungen zu Lymphdrüenschwellungen. Separatdruck aus der G. U. V. F. Z. X. Jahrgang Heft 4.
- ns. Über einige Beziehungen zwischen Zahnheilkunde und Nervenheilkunde.
- insergen. Degeneration der körperlichen Hartgebilde und der Nahrungshygiene D. M. f. Z. 1905.
- nz. Schilddrüse und Zähne. D. M. f. Z. 1912.
- tzen. Geschichte, Theorie und Technik der Statistik.
- kerill. Zahnkaries und Mundsepsis. Berlin 1912.
- nner. Zahn- und Nervenkrankheiten. Nervenleiden in ihrem Zusammenhang.
- pert und Sternberg. Lehrbuch der Allgemeinen und speziellen Pathologie.
- tsch. Handbuch der Zahnheilkunde Bd. 3 und 4.
- nz. Kiefer und Zähne als Entwicklungsdiagnostikum einer gestörten körperseelischen Individualkonstitution. Deutsche Zahn- und Kieferheilkunde Heft 1.
- ivinski. Zahnuntersuchungen an der Bürgerschule zu Holzminden.
- ause. Die Statistik der Karies.
- wroth. Die Zahnärztliche Behandlung der Volksschulkinder in Waldenburg i. Schles.

Lebenslauf:

Ich wurde am 6. April 1892 zu Fürth i. Bay. geboren, besuchte hier Volks- und Realschule. Alsdann widmete ich mich nach Besuch der Lehrerbildungsanstalt Schwabach dem Volksschullehrer-Beruf. 1924 bestand die Reifeprüfung an der Oberrealschule Fürth. Nach 6 Semester naturwissenschaftlichen Studium nahm ich das Studium der Zahnheilkunde auf und erwarb 1929 die zahnärztliche Approbation. Seitdem bin ich in eigener Praxis tätig.



